

(別紙1-1)

(1)

836 神経系に作用する薬剤

薬剤名	組成・剤形・容量	用 量	備考
ベンジアゼピン系 睡眠薬(短時間型)	ロルメタゼパム lormetazepam ●ロラメット Loramet (ワイズ・武田) <small>錠 25.10</small>	錠：1mg 1回1～2mg、就寝前 高齢者には1回2mgまで	④ CYPで代謝されないため、肝疾患や高齢者でも使いやすく相互作用の心配が少ない。hangoverがほとんどみられない ④ 不眠症 ④ 急性狭隔角縁内障、重症筋無力症 ④ (半減期) 1mg内服 10時間
	●エバミール Evamyl (シェーリング) <small>錠 23.70</small>	錠：1mg ② 危険を伴う機械の操作に従事させない ④ ↑中枢神経抑制薬、MAO阻害薬、飲酒、ダントロレンナトリウム、↑塩酸マプロチリン ④ (重大) 依存性、刺激興奮、錯乱、呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス、眼気、ふらつき、倦怠感、頭重感、頭痛、めまい、肝機能異常、発疹、搔痒など	
	塩酸リルマザホン rilmazafone hydrochloride ●リスマー Rhythmy (塩野義) <small>1mg錠 23.20 2mg錠 36.30</small>	錠：1mg, 2mg 不眠症：1回1～2mg、就寝前 麻醉前投薬：1回2mg、就寝前又は手術前投与 高齢者には1回2mgまで	④ 体内で4種の活性代謝物に変換、筋弛緩作用が弱い ④ 不眠症、麻酔前投薬 ④ 急性狭隔角縁内障、重症筋無力症 ④ (半減期) 2mg 空腹時内服 11時間 (総活性代謝物) ④ ↑飲酒、中枢神経抑制薬、MAO阻害薬 ④ (重大) 呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス、依存性、刺激興奮、錯乱、眼気、ふらつき、頭痛、めまい、妄想、肝障害、不整脈、口渴、恶心・嘔吐、発疹など
	塩酸リルマザホン(MEEK)		
	フルニトラゼパム flunitrazepam ●サイレース Silece (エーザイ) <small>1mg錠 18.40 2mg錠 26.40 注 172</small>	④ (向2) 内服14日 錠：1mg, 2mg 注：2mg 1mL 内服：1回 0.5～2mg 就寝前又は手術前、高齢者には1回1mgまで 注射： 麻酔導入：0.02～0.03mg/kg 麻酔時鎮静：0.01～0.03mg/kg 必要に応じて初回量の半量～同量を追加可	④ 強力な睡眠作用 ④ [内服] 不眠症、麻酔前投薬 [注射] 全身麻酔の導入、局所麻酔時の鎮静 ▶ 興奮例での鎮静、入眠促進に使用されることもある ④ 急性狭隔角縁内障、重症筋無力症 ④ (半減期) 2mg 内服 6.8 時間、2mg 静注 24時間(β) ④ 自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させない ④ ↑飲酒、中枢神経抑制薬、シメチジン、MAO阻害薬(舞踏病) ④ (重大) [内服] 依存性、刺激興奮、錯乱、呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス、肝機能障害、黄疸、横紋筋融解症、悪性症候群、意識障害。 [注射] 無呼吸、呼吸抑制、舌根沈下、錯乱、ふらつき、眼気、倦怠感、AST・ALTの上昇、口渴、脱力感、血圧低下など
	●ロヒプノール Rohypnol (中外) <small>1mg錠 17.10 2mg錠 25.50 静注用 150</small>	錠：1mg, 2mg 前注用：2mg 1mL	
	ビピットエース、フルトラース、フルニトラゼパム「アメル」		

④ ↑：本剤の作用増強 ↓：本剤の作用減弱 ▲：併用薬の作用増強 △：併用薬の作用減弱

薬剤名	組成・剤形・容量	用 量	備 考
経口用第一世代セフエム系薬	セファレキシン cefalexin(CEX) ●ケフレックス Keflex (塩野義) カプセル 32.20 シロップ用細粒 24.70/g	(註B) カプセル：250mg シロップ用細粒：10%, 20%(オレンジ)	成人・小兒(20kg以上)：1回250mg, 6時間毎 重症：1回 500 mg, 6時間毎 幼・小兒(ドライシロップ)：1日25～50mg/kg, 6時間毎 重症：1日50～100 mg/kg, 6時間毎
	●センセファリン Sencephalin (武田) カプセル 32.30	カプセル *：125mg, 250mg シロップ用細粒 *：10%, 20%(バナナ)	[錠・カプセルのみ]淋菌, エンテロバクター属, プロテウス属, モルガニラ, モルガニー, プロビデンシア属 [菌]表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 泌尿炎, 麦粒腫, 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 齧周組織炎, 頸炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染.
	●ラリキシン Larixin (富山化学・大正富山*) 錠 12.30 カプセル 12.00 10%ドライシロップ 9.10/g 20%ドライシロップ 13.00/g	錠 *：250mg カプセル *：250mg ドライシロップ *：10%(ラズベリー), 20%(ストロベリー)	[錠・カプセルのみ]乳腺炎, 骨髓炎, 筋炎, 前立腺炎(急性症, 慢性症), 精巢上体炎(副睾丸炎), 淋菌感染症, 子宮頸管炎, パルトリノ肺炎, 子宮内感染, 角膜炎(角膜潰瘍を含む), 化膿性唾液腺炎, 齧周組織炎, 上顎洞炎, [シロップ用細粒・ドライシロップのみ]猩紅熱 ④ 尿中排泄約90%(6時間) (平成四) 250mg カプセル 1.2時間
	オーレキシン, シンクル, セファレキシン「タツミ」「トーワ」「日医工」「マルコ」		④ (重大) ショック, アナフィラキシー様症状, 急性腎不全, 頭粒球減少(ケフレックス, ラリキシン除く), 溶血性貧血, 偽膜性大腸炎, 皮膚粘膜眼症候群, 中毒性表皮壊死症, 間質性肺炎, PIE症候群 (その他)過敏症, 頭粒球減少, 好酸球增多, 血小板減少, 肝障害, 消化器障害, 臨交代症, ビタミンK・B欠乏症, 頭痛, めまいなど
	セファレキシン徐放製剤 ●L-ケフレックス L-Keflex (塩野義) 50%顆粒 85.00/g 小兒用顆粒 72.70/g	(註B) (胃溶性顆粒, 腸溶性顆粒混合) 顆粒：50% (500 mg/g) 小兒用顆粒：20% (200mg/g) 重症：50～100mg/kg, 2回分服	持続性(胃溶30%, 腸溶70%)製剤 ④ [菌]ブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシェラ属, [50%顆粒のみ]プロテウス・ミラビリス [菌]表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 泌尿炎, 麦粒腫, 外耳炎, 齧周組織炎, 頸炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染, [50%顆粒のみ]乳腺炎, 扁桃周囲炎, 前立腺炎(急性症, 慢性症), パルトリノ肺炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 齧周組織炎, [小兒用のみ]猩紅熱 ④ 尿中排泄 500mg 内服 56%, 1g 92% (12時間)
	L-キサー, L-バシビドール, L-ラスピロジン, セファレキシン-R, セファレックスR, セフラング	④ かまずに服用, 制酸剤との配合・同時服用は避ける ④ (重大) ショック, アナフィラキシー様症状, 急性腎不全, 溶血性貧血, 偽膜性大腸炎, 皮膚粘膜眼症候群, 中毒性表皮壊死症, 間質性肺炎, PIE症候群 ④ CEX参照	

*ジェネリック医薬品

(別紙1-2)

67. 漢方薬 1035

薬剤名	組成・容量・〔1日用量〕	備考
安中散 ツムラ顆粒(5), コタロー細粒(N5), カプセル(NC5), カネボウ細粒(KB-5, EK-5)	ケイヒ 4.0 カンゾウ 1.0 エンゴサク 3.0 シュクシャ 1.0 ボレイ 3.0 リョウキョウ 0.5 ウイキョウ 1.5 〔②7.5g, ②6g又は6cap, ②6g〕	〔陰, 虚〕 〔神經性胃炎, 慢性胃炎, 胃アトニー〕 〔やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、吐き気などを伴う諸症〕
〔顆粒 8.60/g〕	〔カンゾウ・グリチルリチン酸製剤(偽アルドステロン症, ミオバシー)〕 〔重複 偽アルドステロン症, ミオバシー 〔その他の〕 発疹, 発赤, 痒痒など〕	
胃苓湯 ツムラ顆粒(115)	コウボク 2.5 ブクリョウ 2.5 ソウジツ 2.5 ケイヒ 2.0 タクシャ 2.5 ショウキョウ 1.5 チョレイ 2.5 タイソウ 1.5 チンピ 2.5 カンゾウ 1.0 ビャクジョウ 2.5 〔②7.5g〕	〔中間型, 中等度〕 〔食あたり, 暑氣あたり, 冷え腹, 急性胃腸炎, 腹痛〕 〔水滸性の下痢, 嘔吐があり, 口渴, 尿量減少を伴う諸症〕 〔参考〕 安中散参照
〔顆粒 19.30/g〕		
茵陳蒿湯 ツムラ顆粒(135), コタロー細粒(N135), カプセル(NC135), カネボウ細粒(KB-402, EK-402)	インセンコウ 4.0 サンシン 3.0 ダイオウ 1.0 〔②7.5g, ②6g又は6cap, ②6g〕	〔陽, 實〕 〔黄疸, 肝硬変症, ネフローゼ, 蓄麻疹, 口内炎〕 〔尿量減少, やや便秘がちで比較的体力のあるものの諸症〕 〔肝機能障害, 黄疸〕 〔参考〕 食欲不振, 胃部不快感, 腹痛, 下痢など
〔顆粒 9.80/g〕		
茵陳五苓散 ツムラ顆粒(117)	タクシャ 6.0 ブクリョウ 4.5 ソウジツ 4.5 ケイヒ 2.5 チョレイ 4.5 インセンコウ 4.0 〔②7.5g〕	〔中間型, 中等度〕 〔嘔吐, 蓄麻疹, 二日酔のむかつき, むくみ〕 〔のどが渇いて, 尿が少ないものの諸症〕 〔参考〕 発疹, 発赤, 痒痒など
〔顆粒 31.00/g〕		
温経湯 ツムラ顆粒(106), コタロー細粒(N106)	バクモンドウ 4.0 センキュウ 2.0 ハング 4.0 ニンジン 2.0 トウキ 3.0 ボタンビ 2.0 カンゾウ 2.0 ゴシュユ 1.0 ケイヒ 2.0 ショウキョウ 1.0 シャクヤク 2.0 アキョウ 2.0 (アキョウは②のみ) 〔②7.5g, ②12g〕	〔陰, 虚〕 〔月経不順, 月経困難, こしけ, 更年期障害, 不眠, 神経症, 肌疹, 足腰の冷え, しもやけ〕 〔手足がほてり, 春がかわくものの諸症〕 〔参考〕 安中散参照 〔参考〕 安中散参照+〔その他の〕 蓄麻疹, 食欲不振, 胃部不快感, 悪心, 下痢など
〔顆粒 26.80/g〕		
温清飲 ツムラ顆粒(57), コタロー細粒(N57), カネボウ細粒(KB-57, EK-57)	ジオウ 3.0 オウゴン 1.5 シャクヤク 3.0 オウバク 1.5 センキュウ 3.0 オウレン 1.5 トウキ 3.0 サンシン 1.5 〔②7.5g, ②12g, ②6g〕	〔中間型, 中等度〕 〔月経不順, 月経困難, 血の道症, 更年期障害, 神経症〕 〔皮膚の色つやが悪く, のぼせるものの諸症〕
〔顆粒 18.70/g〕	〔肝機能障害, 黄疸 〔その他の〕 発疹, 発赤, 食欲不振, 胃部不快感, 悪心, 嘔吐, 下痢など〕	