

(別紙2-1)

(1)

品名, 規格単位	適応, 用法・用量	警告, 禁忌, 副作用等	
フルニトラゼパム(flunitrazepam) 向II習			
ベンゾジアゼピン系睡眠薬(中間作用型)	サイレース Silece (エーザイ) ① 1mg, 2mg ② 2mg/1mL ③ 14日 ④ 2mg/1mL	① 不眠症, 麻酔前投薬 → 1回0.5~2mgを就寝前又は手術前(高齢者) 1回1mgまで ② ①全身麻酔の導入 → 0.02~0.03mg/kg ③ ②局所麻酔時の鎮静 → 0.01~0.03mg/kg いずれも(急)で2倍以上に希釈し, 1mg/分以上かけて静注, 必要に応じ初回量の半量~同量を追加 錯乱 (併注) アルコール, 中枢神経抑制薬, MAO阻害薬, シメチジン (半減期) ④ 6.8時間(2mg), ⑤ α2時間, β24時間(2mg静注) (授乳婦) 授乳回避	(禁) 急性狭隅角緑内障, 重症筋無力症(原則禁)呼吸機能高度低下 (副)(重大) (急) 大量連用(依存性), 刺激興奮・錯乱(精神障害者), 呼吸抑制, 炭酸ガスナルコーシス(呼吸機能高度低下), 肝機能障害, 黄疸, 横紋筋融解症, 悪性症候群(抗精神病薬等との併用), 意識障害, 一過性前向き健忘, もうろう状態 (急) 無呼吸, 呼吸抑制, 舌根沈下
	ロヒプノール Rohypnol (中外) ① 1mg, 2mg ② 14日 (粉砕) ③ ④ 2mg/1mL (ジェネリック) ビビットエース, フルトラス, フルニトラゼパム		
クアゼパム(quazepam) 向III習			
ベンゾジアゼピン系睡眠薬(長時間作用型)	ドラール Doral (久光=相辺三菱) ① 15mg, 20mg ② 14日 (ジェネリック) クアゼパム	① 不眠症 → 1回20mgを就寝前(1日最高) 30mgまで ② 麻酔前投薬 → 手術前夜, 1回15~30mgを就寝前(1日最高) 30mgまで (その他(5%以上)) 眠気・傾眠 (併注) アルコール, 中枢神経抑制薬, MAO阻害薬, シメチジン (半減期) 37時間(15mg絶食時) (代謝) 主にCYP2C9, 3A4 (授乳婦) 授乳回避	(禁) 急性閉塞隅角緑内障, 重症筋無力症, 睡眠時無呼吸症候群(併禁) 食物, リトナビル (原則禁) 呼吸機能高度低下 (副)(重大) 大量連用(依存性), 刺激興奮・錯乱(精神障害者), 呼吸抑制, 炭酸ガスナルコーシス(呼吸機能高度低下), 精神症状(幻覚, 妄想等), 意識障害, 思考異常, 勃起障害, 興奮, 運動失調, 運動機能低下, 錯乱, 協調異常, 言語障害, 振戦, 一過性前向き健忘, もうろう状態

2
睡眠薬・抗不安薬

●...剤形が先発品と異なる ■...適応が先発品と異なる

(2)

1102 ◆ 抗菌薬

品名, 規格単位	適応, 用法・用量	警告, 禁忌, 副作用等	
第一世代セフェム系薬 (経口剤)	リン, ザルツクラール, シーシーエル, セクロダン, セファクロー, トキクロー, ルベラール, エーシーシーエル	<p>効 (細参照)</p> <p>→ 成人・体重20kg以上の小児: 1日750mgを3回に分服</p> <p>重症・低感受性症例 1日1500mgを3回に分服</p> <p>徐放剤 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 中耳炎</p> <p>→ 成人・体重20kg以上の小児: 1日750mgを朝夕食後2回に分服 重症・低感受性症例 1日1500mgを朝夕食後2回に分服</p> <p>腎機能 (ケフラール) 腎不全時: B (最小量投与), 透析時: B (最小量投与)</p>	<p>3回に分服, 徐放剤 体重20kg以上の小児: 1日750mgを朝夕食後2回に分服</p> <p>重症・低感受性症例 1日1500mgを朝夕食後2回に分服</p>
	セファトリジンプロピレングリコール(propylene glycol cefatrizine), CFT		
セアブロン Seapuron (長生堂)	<p>効 黄色ブドウ球菌, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス・ミラビリス, インフルエンザ菌</p> <p>効 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 膀胱炎, 腎盂腎炎</p> <p>→ 1回250mgを6時間毎</p> <p>小児 (シロップ用のみ): 1日30~50mg/kgを6時間毎に分服, 用時溶解</p>	<p>禁 伝染性単核症 (原則禁) セフェム系抗菌薬過敏症歴</p> <p>副作用 (重大) ショック, アナフィラキシー様症状, 溶血性貧血, 偽膜性大腸炎, 皮膚粘膜眼症候群, 類薬(間質性肺炎, PIE症候群, 急性腎不全)</p> <p>小児 シロップ用 1日30~50mg/kgを6時間毎に分服</p>	
セファドロキシル(cefadroxil), CDX			
サマセフ Samacef (ブリストル・マイヤーズ)	<p>効 ブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, プロテウス・ミラビリス</p> <p>効 表在性・深在性皮膚感染症, 慢性膿皮症, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎</p> <p>→ 1回250mgを1日3回</p> <p>重症・効果不十分 1回500mgを1日3回</p> <p>シロップ用 (効参照; 他に猩紅熱)</p> <p>→ 幼小児: 1日20~40mg/kgを用時懸濁し3回に分服</p>	<p>禁 伝染性単核症 (原則禁) セフェム系抗菌薬過敏症歴</p> <p>副作用 (重大) ショック, 偽膜性大腸炎, 皮膚粘膜眼症候群, 類薬(溶血性貧血, 間質性肺炎, PIE症候群, 急性腎不全)</p> <p>半減期 効 1.2時間(250mg)</p> <p>小児 シロップ用 1日20~40mg/kgを用時懸濁し3回に分服</p>	
セファレキシン(cefalexin), CEX			
ケフレックス Keflex (塩野義)	<p>効 徐放剤 徐放剤 (小児用)ブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシエラ属, (小児</p>	<p>原則禁 セフェム系抗菌薬過敏症歴</p> <p>副作用 (重大) ショック, アナフィラ</p>	