

品名, 規格単位	適応, 用法・用量	警告, 禁忌, 副作用等
<p>② 250mg シロップ用 100mg/g (10%), 200mg/g(20%)</p> <p>L-ケフレックス L-Keflex (塩野義)</p> <p>④ 徐放剤 500mg/g(50%) ⑤ 徐放剤 [小児用] 200mg/g(20%)</p> <p>シンクル Syncl (旭化成ファーマ)</p> <p>④ 250mg ⑤ 250mg シロップ用 200mg/g(20%)</p> <p>⑦ ジェネリック) オーレキシシ, セファレキシシ, セファレキシシ-R, セファレックスR, セフロング, センセファリン, ラリキシシ, L-キザール, L-バシビドール, L-ラスポリジン</p>	<p>用)除く)プロテウス・ミラビリス</p> <p>④ ⑤ シロップ用) ブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, 大腸菌, クレブシエラ属, インフルエンザ菌, (④ ⑤ のみ) 淋菌, エンテロバクター属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロピデンシア属</p> <p>④ ⑤ 徐放剤) [小児用] 表在性・深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 涙囊炎, 麦粒腫, 外耳炎, 歯周組織炎, 顎炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染, 猩紅熱</p> <p>➔ 幼小児: 1日25~50mg/kgを朝夕食後2回に分服 (重症・低感受性症例) 1日50~100mg/kg</p> <p>④ ⑤ 徐放剤) (④ ⑤ 徐放剤) [小児用] 参照: 但し猩紅熱除く, 他に乳腺炎, 扁桃周囲炎, 前立腺炎(急性症, 慢性症), バルトリン腺炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 歯冠周囲炎)</p> <p>➔ 成人・体重20kg以上の小児: 1日1gを朝夕食後2回に分服 (重症・低感受性症例) 1日2g</p> <p>④ ⑤ シロップ用) 表在性・深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 涙囊炎, 麦粒腫, 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 歯周組織炎, 顎炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染, 猩紅熱</p> <p>➔ 幼小児: 1日25~50mg/kgを6時間毎に分服 (重症・低感受性症例) 1日50~100mg/kgを6時間毎に分服</p> <p>④ ⑤ ⑦ (④ ⑤ シロップ用) 参照: 但し猩紅熱除く, 他に乳腺炎, 骨髄炎, 筋炎, 前立腺炎(急性症, 慢性症), 精巣上体炎(副睾炎), 淋菌感染症, 子宮頸管炎, バルトリン腺炎, 子宮内感染, 角膜炎(角膜潰瘍を含む), 化膿性唾液腺炎, 歯冠周囲炎, 上顎洞炎)</p> <p>➔ 成人・体重20kg以上の小児: 1回250mgを6時間毎 (重症・低感受性症例) 1回500mgを6時間毎</p> <p>⑧ 腎機能) (ケフレックス) 腎不全時: B (Crに依り減量及び投与間隔延長). 透析時: B (減量して透析終了後投与)</p>	<p>キシー様症状, 急性腎不全, 溶血性貧血, 偽膜性大腸炎, 皮膚粘膜眼症候群, 中毒性表皮壊死症, 間質性肺炎, PIE症候群</p> <p>④ ⑤ ⑦ 半減期) 2.9時間(250mg)</p> <p>④ ⑤ ⑦ (小児) 徐放剤) [小児用] 1日25~50mg/kgを朝夕食後2回に分服 (重症・低感受性症例) 1日50~100mg/kg</p> <p>④ ⑤ シロップ用) 1日25~50mg/kgを6時間毎に分服 (重症・低感受性症例) 1日50~100mg/kgを6時間毎に分服</p>
<p>セフロキサジン水和物(別名:セフロキサジン)(cefroxadine hydrate), CXD</p>		
<p>オラスポア Oraspor (アルフレッサファーマ)</p>	<p>④ ⑤ ブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス・ミラビリス, インフルエンザ菌</p>	<p>⑧ 原則禁) セフェム系抗菌薬過敏症歴</p> <p>④ ⑤ ⑧ (重大) ショック, 偽膜性大腸炎, 間質性肺炎, PIE症候群, 皮</p>

第一世代セフェム系薬 (経口剤)

59 抗菌薬

●...剤形が先発品と異なる ■...適応が先発品と異なる

1316 ◆ 漢方薬

品名,規格単位	適応,用法・用量	警告,禁忌,副作用等
安中散		
安中散 アンチュウサン ④ クラシエ(KB-5, EK-5) ④ コタロー(N5) ④ ツムラ(TJ-5) ④ コタロー(NC5) ケイヒ4.0,エンゴサク・ボレイ各3.0,ウイキョウ1.5,カンゾウ・シュクシャ各1.0,リョウキョウ0.5の割合の混合生薬エキス末	神経性胃炎,慢性胃炎,胃アトニー(やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり,胃痛又は腹痛があって,ときに胸やけ,げっぷ,食欲不振,吐き気等を伴う) ▶ ④ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㉔,㉕),④ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㉖),④ 1日6カプセル,食前又は食間2~3回に分服(㉗)	④(重天) 偽アルドステロン症,ミオパシー ④(併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(調剤・薬学管理のPoint) 併用時注意:カンゾウ1~2g/日,カプセルあり:㉕	
胃苓湯		
胃苓湯 イレイトウ ④ ツムラ(TJ-115) コウボク・ソウジュツ・タクシャ・ショレイ・テンピ・ビャクジュツ・ブクリョウ各2.5,ケイヒ2.0,ショウキョウ・タイソウ各1.5,カンゾウ1.0の割合の混合生薬エキス末	食あたり,暑気あたり,冷え腹,急性胃腸炎,腹痛(水瀉性の下痢,嘔吐があり,口渇,尿量減少を伴う) ▶ 1日7.5g,食前又は食間に2~3回に分服	④(重天) 偽アルドステロン症,ミオパシー ④(併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(調剤・薬学管理のPoint) 併用時注意:カンゾウ1g/日	
茵陳蒿湯		
茵陳蒿湯 インチンコウトウ ④ クラシエ(KB-402, EK-402) ④ コタロー(N135) ④ ツムラ(TJ-135) ④ コタロー(NC135) インチンコウ4.0,サンシシ3.0,ダイオウ1.0の割合の混合生薬エキス末	黄疸,肝硬変症,ネフローゼ,蕁麻疹,口内炎(尿量減少,やや便秘がちで比較的体力のあるもの) ▶ ④ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㉔,㉕),④ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㉖),④ 1日6カプセル,食前又は食間2~3回に分服(㉗)	④(重天) 肝機能障害,黄疸
臨床情報	④(調剤・薬学管理のPoint) カプセルあり:㉗	
茵陳五苓散		
茵陳五苓散 インチンゴレイサン	嘔吐,蕁麻疹,二日酔のむかつき,むくみ(喉が渇いて,尿が少ないもの) ▶ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	

※別表1-1, 1-2, 2-1, 2-2は省略